

WENKBRAUWLIFT
frisse en jeugdige uitstraling

SIGNÉ CLINICS

DE SPECIALIST



“

Ik zie cosmetische chirurgie als een kunst. Je bent bezig met het beeldhouden van een gezicht, waarbij licht- en schaduw-inval van belang zijn en in mijn optiek elke millimeter telt.

”

Drs. Nastja Hendriks
Cosmetisch arts KNMG

Drs. Nastja Hendriks is in 2017 afgestudeerd als arts aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft veel klinische ervaring opgedaan binnen de Chirurgie. Vervolgens heeft ze zich volledig gericht op de cosmetische geneeskunde. In januari 2022 heeft Nastja de titel cosmetisch arts KNMG behaald. Haar expertise ligt binnen de injectables en cosmetische chirurgie van het gezicht.

WENKBRAUWLIFT

voor de behandeling

Een wenkbrauwlift tilt de wenkbrauwen op door huid boven de wenkbrauwen te verwijderen. Hierdoor krijg je een open en frisse blik terug. Lees deze stappen voorafgaand aan de ingreep goed door voor een mooi resultaat.

1 Cafeïne gebruik

Om eventuele nabloedingen te voorkomen, mag je op de dag van de ingreep zowel voor als na de ingreep geen koffie drinken. Je bloeddruk gaat namelijk licht omhoog als je koffie drinkt.

2 Alcohol gebruik

Vanaf 72 uur voor de ingreep tot 48 uur na de ingreep mag je geen alcohol gebruiken. Alcohol verdunt het bloed, waardoor je tijdens en na de ingreep meer dan normaal kan gaan bloeden.

3 Medicijnen

Als je bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet je dit melden bij de behandelend arts. De meeste pijnstillers zijn namelijk ook bloedverdunners. Daarnaast vragen wij om een actueel medicatieoverzicht (AMO) van de apotheek mee te nemen indien je medicijnen gebruikt.

4 Voedselinname


Op de dag van de ingreep kan je een licht ontbijt nemen.

5 Make-up

Op de dag van de ingreep is het belangrijk dat je gezicht geen make-up of dagcrème draagt. Als je normaal gesproken contactlenzen draagt, moet je die vóór de ingreep uitdoen. Vergeet ook niet om al je piercings en sieraden voor de ingreep af te doen.

7 Roken

Zowel voor als na de operatie mag je zeker 2 weken niet roken. Roken geeft namelijk een slechtere wondgenezing en een verhoogde kans op complicaties.





WENKBRAUWLIFT na de behandeling



Complicaties doen zich zelden voor. Op het begin kunnen je wenkbrauwen wat te hoog staan en kan je een trekkend gevoel ervaren, dit trekt vanzelf weer bij. Mocht de wond blijven nabloeden, neem dan contact op met Signé Clinics. Buiten kantoor tijden kan je contact opnemen met je operateur of bij spoed het spoednummer bellen. Voor telefoonnummers, zie contactgegevens

1 Koelen

Zorg ervoor dat je de wondjes thuis goed koelt. Doe dit de eerste dag elk uur voor ongeveer 10 minuten met koelelementen of ijskompresen. Dit helpt om zwelling te verminderen. De volgende dagen koel je zoveel dat nodig is. Plaats het ijskompres echter nooit direct op je huid; leg altijd een wegwerpzakdoekje tussen je huid en het kompres. Als je dat wilt, kun je na de operatie ook Arnica gebruiken.

2 Douchen

Om een infectie te voorkomen en genezing te bevorderen, mogen de pleisters en het litteken de eerste week na de ingreep niet nat worden. Gebruik een douchekapje dat je tot over je neus kan trekken of zet de douchekop lager als dat kan. Douche niet te lang en gebruik niet te heet water (door hitte kan er namelijk extra zwelling ontstaan).

3 Sporten

Je mag gedurende 1 tot 2 weken na de ingreep geen druk verhogende activiteiten ondernemen. Dit houdt in dat je niet mag bukken, niet mag sporten, niet zwaar mag tillen, niet mag persen, geen vliegreis mag maken en geen zware lichamelijke inspanning mag verrichten etc. Ook mag je niet zwemmen of een sauna bezoeken.

4 Cafeïne gebruik

Om eventuele nabloedingen te voorkomen, mag je op de dag van de ingreep zowel voor als na de ingreep geen koffie drinken. Je bloeddruk gaat namelijk licht omhoog als je koffie drinkt.

5 Zonlicht

Je mag de littekentjes minstens 4 weken na de ingreep niet blootstellen aan de zon of zonnebank. Het dragen van een zonnebril, ook met bewolkt weer, wordt aangeraden.

6 Make-up

Je mag de eerste 2 weken na de ingreep geen make-up op of rond je wenkbrauwen opbrengen. 2 weken na de operatie is dit weer toegestaan.

7 Pijnstilling

Na de ingreep is de huid rondom de wenkbrauwen wat gevoelig. Je kan hiertegen zo nodig Paracetamol innemen. Neem geen NSAID's (Aspirine) zoals neurofen, diclofenac, ibuprofen, aangezien deze pijnstillers een bloed verdunnend effect hebben. Mocht je ondanks de paracetamol forse pijnklachten hebben, neem dan contact op met Signé Clinics.

8 Slapen

Tijdens het slapen kan je beter 2 hoofdkussens gebruiken. Je hoofd komt wat hoger te liggen waardoor de kans op extra zwelling afneemt.

11 Controle

Tussen de 7 en 10 dagen kom je terug op controle bij de behandelend arts. Indien de wondjes goed genezen zijn, worden de hechtingen eruit gehaald.

DE RESULTATEN



WENK BRAUWLIFT

SIGNÉ CLINICS



CONTACT



SIGNÉ CLINICS

Pannekoekstraat 54a
3011 LJ Rotterdam

Ketelhavenstraat 41
5045 NG Tilburg

085 - 488 17 88
info@signeclinics.nl
www.signeclinics.nl

Laat een review achter



scan me!

signē .